

**Prospect: Informații pentru utilizator****VESSEL DUE F 250 ULS capsule moi**  
Sulodexid

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Vessel Due F și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Vessel Due F
3. Cum să luați Vessel Due F
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Vessel Due F
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Vessel Due F și pentru ce se utilizează**

O capsulă moale conține sulodexid 250 ULS (unități lipasemice sulodexid).  
Vessel Due F este utilizat ca tratament curativ pentru patologia vasculară cu risc de tromboză.

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Vessel Due F****Nu luați Vessel Due F**

- dacă sunteți alergic la sulodexid, heparină, alte produse de tip heparinic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).

**Atenționări și precauții**

A nu se lua cu puțin înainte, în timpul sau imediat după masă.  
Vessel Due F este indicat la adulți.

O capsulă de Vessel Due F conține 0,31 mg sodiu.. Acest lucru este important pentru pacienții a căror dietă restricționează aportul zilnic de sodiu.

**Vessel Due F împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

**Vessel Due F împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Vessel Due F nu trebuie luat cu puțin înainte, în timpul sau imediat după masă.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Vessel Due F nu are nici o influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

## **3. Cum să luați Vessel Due F**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este de 1-2 capsule moi de 2 ori pe zi, între mesele principale.

### **Utilizarea la copii**

Vessel Due F este utilizat la adulți.

### **Dacă luați mai mult Vessel Due F decât trebuie**

Singurul efect care poate să apară în caz de supradozaj este hemoragia. În caz de hemoragie este necesară administrarea de protamină sulfat 1% așa cum este utilizat în “hemoragiile determinate de heparină”.

### **Dacă uitați să luați Vessel Due F**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să luați Vessel Due F**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse la medicamente sunt clasificate după cum urmează:

**foarte frecvente:** afectează mai mult de 1 utilizator din 10

**frecvente:** afectează 1 până la 10 utilizatori din 100i

**mai puțin frecvente:** afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000

**rare:** afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000

**foarte rare:** afectează mai puțin de 1 utilizator din 10000

**frecvență necunoscută** (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Mai puțin frecvente: dureri de cap, disconfort abdominal, senzație de arsură la stomac (dispepsie), gaze (flatulență), vărsături, eczemă (senzația de mâncărime, piele de culoare roșie, uscată), înroșirea pielii, urticarie

Foarte rare: pierderea conștienței, sângerare din stomac (hemoragie gastrică), umflarea gleznelor, picioarelor sau degetelor (edem periferic)

Frecvente: amețală (senzația că se învâртеște camera), dureri în partea superioară a abdomenului, diaree, durere de stomac, greață, erupții pe piele

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul

Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Vessel Due F**

A se păstra la temperaturi sub 30°C

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Vessel Due F**

- Substanța activă este sulodexid. O capsulă moale conține sulodexid 250 ULS (unități lipasemice sulodexid).

- Celelalte componente sunt: *conținutul capsulei*-laurilsarcosinat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal, triacetin; *învelișul capsulei*-gelatină, glicerol, etil-para-oxibenzoat de sodiu (E 215), propil- para-oxibenzoat de sodiu (E 217), dioxid de titan (E 171), oxid roșu de fer (E 172).

### **Cum arată Vessel Due F și conținutul ambalajului**

Se prezintă sub formă de capsule moi de culoare roșie cărămizie, conținând o suspensie omogenă de culoare albă până la gri.

Cutie cu 2 blistere din PVDC-PVC/Al-PVDC a câte 25 capsule moi.

Cutie cu 3 blistere din PVDC-PVC/Al-PVDC a câte 20 capsule moi.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

ALFASIGMA S.p.A.

Via Ragazzi del '99, 5

40133, Bologna (BO), Italia

#### **Fabricantul**

ALFASIGMA S.p.A.

Via Enrico Fermi, 1

65020 Alanno (PE), Italia

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață.

**Acest prospect a fost revizuit în Octombrie, 2018.**