

Prospect: informații pentru utilizator**ALBENDAZOL VIM SPECTRUM 200 mg comprimate**
Albendazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct.4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Albendazol Vim Spectrum și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Albendazol Vim Spectrum
3. Cum să utilizați Albendazol Vim Spectrum
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Albendazol Vim Spectrum
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Albendazol Vim Spectrum și pentru ce se utilizează

Albendazolul aparține medicamentelor denumite preparate antihelmintice, antinematode, fiind activ față de diverși viermi sau paraziți localizați la nivelul intestinului sau altor țesuturi din organism.

Albendazolul este utilizat la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani în tratamentul următoarelor infestări: oxiurază, ascaridioză (limbrici), tricocefaloză, strongiloidoză, teniază, ankilostomiază și necatoriază.

Albendazolul este eficient în giardioză la copiii cu vârsta între 6 și 12 ani.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Albendazol Vim Spectrum**Nu utilizați Albendazol Vim Spectrum**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la albendazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă știți sau credeți că sunteți gravidă sau dacă intenționați să rămâneți gravidă.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Albendazol Vim Spectrum, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți probleme cu ficatul.

- Utilizarea albendazolului a fost asociată cu creșterea concentrației enzimelor hepatice în sânge; acestea au revenit la normal după întreruperea tratamentului. S-ar putea ca medicul dumneavoastră să vă testeze funcția hepatică înaintea începerii tratamentului și în timpul acestuia.
- Dacă aveți teniază și locuiți într-o zonă în care infestările cu *Taenia sp.* sunt frecvente, medicul dumneavoastră vă poate prescrie și alte medicamente pentru reacțiile adverse ale tratamentului.

Albendazol Vim Spectrum împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente

În special, spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați următoarele medicamente, deoarece pot crește efectul albendazolului:

- cimetidină (medicament utilizat pentru a reduce cantitatea de acid produsă în stomac),
- dexametazonă (medicament din grupa glucocorticoizilor folosit în tratamentul unei game largi de afecțiuni)
- praziquantel (medicament utilizat împotriva paraziților și viermilor).

Albendazol Vim Spectrum împreună cu alimente și băuturi

Medicamentul dumneavoastră poate fi luat în timpul mesei, după masă sau pe stomacul gol.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament

Nu utilizați Albendazol Vim Spectrum în timpul sarcinii.

Dacă nu sunteți sigură că sunteți gravidă, medicul dumneavoastră vă poate recomanda să efectuați un test de sarcină.

Evitați să utilizați Albendazol Vim Spectrum la începutul perioadei de sarcină, începând tratamentul doar în prima săptămână a ciclului dumneavoastră menstrual sau după ce obțineți un rezultat negativ al testului de sarcină. În timp ce luați acest medicament utilizați măsuri contraceptive eficiente și încă 5 săptămâni după ce ați terminat tratamentul.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă rămâneți gravidă în timp ce luați Albendazol Vim Spectrum.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați sau dacă intenționați să alăptați. Nu există date suficiente privind administrarea albendazolului în cursul alăptării. Din acest motiv, întrerupeți alăptarea pe timpul administrării albendazolului și încă 5 zile după terminarea tratamentului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Acest medicament poate să influențeze în măsură mică sau moderată capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Poate să provoace amețeli la unele persoane. Ca urmare, aveți grijă când conduceți vehicule sau folosiți utilaje.

Albendazol Vim Spectrum conține lactoză; dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Albendazol Vim Spectrum

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Pentru ca medicamentul să-și facă efectul, nu sunt necesare măsuri speciale cum ar fi: repausul alimentar sau administrarea de purgative.

Medicul dumneavoastră poate considera necesar să vă examineze la 2 - 3 săptămâni după ce ați terminat tratamentul prescris, pentru a se asigura că medicamentul și-a făcut efectul. Uneori poate fi necesară efectuarea unei a doua cure de tratament.

Oxiuriază

Adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani: Doza recomandată este de 2 comprimate (400 mg albendazol) într-o priză unică, repetată după 7 zile.

Se impun măsuri riguroase de igienă și, de asemenea, trebuie tratate și persoanele din anturaj.

Ascaridioză, tricocefaloză, ankilostomiază, necatoriază

Adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani: Doza recomandată este de 2 comprimate (400 mg albendazol) într-o priză unică.

În caz de tricocefaloză, dacă examenul coproparazitologic efectuat la 3 săptămâni după tratament este pozitiv, se efectuează o a doua cură de tratament.

Strongiloidoză, teniază

Adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani: Doza recomandată este de 2 comprimate (400 mg albendazol) în priză unică 3 zile consecutiv. Dacă examenul coproparazitologic efectuat la 3 săptămâni după tratament este pozitiv, se efectuează o a doua cură de tratament.

Giardioză intestinală

La copii cu vârsta între 6 și 12 ani, doza zilnică recomandată este de 2 comprimate (400 mg albendazol), în priză unică, timp de 5 zile.

Utilizarea la copii

Pentru copii cu vârsta sub 6 ani se recomandă forme farmaceutice adecvate vârstei.

Dacă ați utilizat mai mult Albendazol Vim Spectrum decât trebuie

Nu utilizați o doză mai mare decât v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Dacă luați mai mult decât trebuie din Albendazol Vim Spectrum sau dacă altcineva a luat medicamentul dumneavoastră adresați-vă medicului în cel mai scurt timp.

Dacă ați uitat să utilizați Albendazol Vim Spectrum

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Albendazol Vim Spectrum

Trebuie să efectuați în întregime tratamentul recomandat de către medicul dumneavoastră și nu trebuie să-l întrerupeți dacă vă simțiți mai bine.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Încetați administrarea de Albendazol Vim Spectrum și adresați-vă de urgență medicului dacă apar:

- semne de hipersensibilitate cum ar fi: umflare (edem) la nivelul mâinilor, picioarelor, feței, buzelor sau limbii; dificultăți în respirație; erupții trecătoare pe piele, pete roșii, mâncărime;
- febră, frisoane;
- modificări severe la nivelul pielii care se pot extinde pe întreg corpul dumneavoastră și observați formarea unor leziuni sau vezicule la nivelul pielii, gurii și ochilor.

În tratamentul de scurtă durată cu albendazol pot să apară următoarele reacții adverse:

Mai puțin frecvente (afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți)

- durere de cap, amețeli
- vărsături, greață, durere de stomac, durere în capul pieptului, diaree

Rare (afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți)

- creșterea valorilor enzimelor hepatice în sânge
- semne de hipersensibilitate cum ar fi: erupții trecătoare pe piele, urticarie și mâncărime.

Foarte rare (afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți)

- erupții cutanate însoțite de mâncărime (eritem polimorf)
- o varietate deosebit de severă a eritemului polimorf, sindromul Stevens-Johnson, manifestat prin febră și leziuni la nivelul pielii, mucoasei gurii (stânjenind alimentarea), ochilor

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Albendazol Vim Spectrum

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați Albendazol Vim Spectrum după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri ajută la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Albendazol Vim Spectrum

- Substanța activă este albendazolul. Un comprimat conține albendazol 200 mg.
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, dioxid de siliciu coloidal anhidru, amidon pregelatinizat, amidon glicolat de sodiu tip A, stearat de magneziu, laurilsulfat de sodiu, zaharină sodică, aromă etol exotic.

Cum arată Albendazol Vim Spectrum și conținutul ambalajului

Albendazol Vim Spectrum se prezintă sub formă de comprimate rotunde, plate, de culoare albă, cu diametrul de aproximativ 12 mm.

Este disponibil în cutii cu un blister din Al/PVC a 2 comprimate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

S.C. VIM SPECTRUM S.R.L.

547367 Corunca nr. 409, Jud. Mureș

România

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați deținătorul autorizației de punere pe piață.

Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2016.