

**Prospect: Informații pentru utilizator****Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat, soluție  
minoxidil**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție
3. Cum să utilizați Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție și pentru ce se utilizează**

Hairgrow 50 mg/ml este un medicament utilizat pentru a trata căderea părului de cauză androgenică la persoanele cu vârstă între 18 și 65 ani.

Hairgrow 50 mg/ml funcționează cel mai bine la femeile la care părul cade fie din partea superioară a scalpului fie de pe întreaga suprafață a scalpului.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție****Nu utilizați Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție dacă:**

- sunteți alergic la minoxidil sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- aveți vârsta mai mică de 18 ani sau mai mare de 65 de ani;
- ați pierdut părul din cauza administrării unor medicamente;
- aveți orice boală care afectează scalpul, inclusiv arsuri solare și psoriazis;
- aveți scalpul ras;
- utilizați creme, unguente sau loțiuni folosite pentru a trata condițiile de scalp;
- aveți orice fel de pansament sau bandaj pe scalp;
- aveți tensiunea arterială crescută și nu luați tratament pentru scăderea ei;
- aveți o afectare severă a funcției inimii și aceasta prezintă risc de agravare;
- aveți lichid acumulat în foița care îmbracă inima (pericard);
- sunteți gravidă sau alăptați.

### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați **Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție**, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Opriti administrarea Hairgrow și contactați imediat medicul dacă prezentați una dintre următoarele manifestări:

- dacă aveți tensiunea arterială mică sau dacă apar dureri în piept în timpul tratamentului;
- dacă apar bătăi neregulate ale inimii;
- dacă apare înroșirea pielii la nivelul scalpului sau pe întreg corpul;
- dacă vi se umflă mâinile, fața, buzele sau limba.

Acestea pot fi semne ale unor reacții adverse rare dar grave care necesită intervenție terapeutică.

Este foarte important să limitați aplicarea Hairgrow la scalp și nu pe alte regiuni ale corpului. Spălați mâinile după aplicarea Hairgrow și evitați inhalarea acestuia în timpul administrării.

Este posibil ca la începutul tratamentului să vi se pară că părul dumneavoastră cade și mai mult. În principiu este un efect temporar, care nu ar trebui să dureze mai mult de 2 săptămâni. În cazul în care perioada de cădere accentuată a părului este mai lungă de 2 săptămâni, tratamentul cu Hairgrow trebuie oprit și trebuie consultați medicul.

### **Copii și adolescenți**

Nu este indicat administrării pentru copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

### **Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu există dovezi că Hairgrow 50 mg/ml interacționează cu medicamentele sistemice.

Nu este recomandată aplicarea Hairgrow concomitent cu corticosteroizi aplicați topic, tretinoin topic sau vaselină

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Dacă sunteți gravidă, ați putea fi gravidă sau alăptați nu folosiți Hairgrow 50 mg/ml.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Hairgrow 50 mg/ml nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

**Hairgrow 50 mg/ml conține propilenglicol.** Poate provoca iritație cutanată.

## **3. Cum să utilizați Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

- Spălați și uscați complet părul și scalpul înainte de a aplica Hairgrow 50 mg/ml;
- Nu aplicați soluția pe alte suprafețe ale corpului decât scalpul;
- Nu trebuie să aspirați particule de Hairgrow 50 mg/ml atunci când îl pulverizați pe păr;

Doza recomandată este de 1 ml (8 pufuri echivalent cu o doză de 50 mg minoxidil) de 2 ori pe zi timp de 6 săptămâni, aplicată pe zona de scalp afectată de căderea părului. Doza zilnică maximă este de 100 mg minoxidil – 2 ml soluție Hairgrow 50 mg/ml.

Efectul ar trebui să se simtă după 4 luni de tratament. În cazul în care nu se observă după acest interval nici un efect opriți administrarea Hairgrow și consultați medicul.

#### **Mod de administrare**

Țineți pompa la suprafața scalpului. Pulverizați o dată Hairgrow 50 mg/ml, apoi cu degetele masați soluția pe întreaga suprafață a scalpului. Repetați de 8 ori până se aplică 1 ml soluție. Spălați mâinile după fiecare administrare.

Pentru uz extern.

#### **Utilizarea la copii și adolescenți**

Nu se administrează copiilor cu vârsta sub 18 ani.

#### **Dacă utilizați mai mult Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție decât trebuie**

Cereți imediat asistență medicală în cazul în care cineva, inclusiv un copil, utilizează prea mult din acest medicament.

Ingestia accidentală a soluției capilare poate provoca efecte sistemice, datorită acțiunii vasodilatatoare a minoxidilului (5 ml soluție conține 100 mg minoxidil, în timp ce doza orală eficientă în hipertensiunea arterială este de 40 mg pe zi). În caz de supradozaj pot să apară semne și simptome cardiovasculare, cu scăderea tensiunii arteriale, creșterea frecvenței bătăilor inimii, acumularea de lichide în țesuturi și durere în piept. În cazul apariției unor asemenea manifestări opriți administrarea și vorbiți imediat cu medicul dumneavoastră.

#### **Dacă uitați să utilizați Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție**

Nu folosiți o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați următoarele manifestări, opriți imediat administrarea Hairgrow 50 mg/ml și luați legătura cu medicul dumneavoastră:

- Scăderea tensiunii arteriale;
- Durere în piept;
- Palpitații;
- Bătăi rapide ale inimii;
- Stare de leșin sau amețeală;
- Creștere rapidă și neașteptată în greutate;
- Umflarea mâinilor și picioarelor;
- Înroșirea rapidă și persistentă a pielii;
- Durere de cap;
- Respirație dificilă sau scurtarea respirației;
- Acnee.

Alte reacții adverse înregistrate la administrarea topică de minoxidil sunt:

- Creșterea părului pe zone nedorite (spălați întotdeauna mâinile cu apă din abundență după aplicarea soluției);

- Roșeața scalpului, mâncărime pe zona de aplicare sau uscăciunea acesteia – acestea s-ar putea datora conținutului în propilenglicol și ar trebui să dispară în scurt timp. Dacă persistă opriți utilizarea Hairgrow 50 mg/ml;
- Pirderea accelerată a părului în primele 2 săptămâni de administrare – dacă aceasta durează mai mult de 2 săptămâni opriți administrarea Hairgrow 50 mg/ml și luați legătura cu medicul dumneavoastră;
- Modificarea culorii sau texturii părului – dacă apare opriți administrarea Hairgrow 50 mg/ml.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Soluția este inflamabilă și se recomandă evitarea expunerii flaconului și conținutului în locuri cu flacără în timpul folosirii, depozitării și eliminării.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție**

- Substanța activă este minoxidil; 1 ml spray cutanat conține 50 mg minoxidil.
- Celelalte componente sunt: apă purificată, propilenglicol și alcool etilic.

### **Cum arată Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat soluție și conținutul ambalajului**

Hairgrow 50 mg/ml spray cutanat este o soluție alcoolică incoloră până la slab gălbuie.

Cutie cu un flacon pulverizator din PEÎD prevăzut cu pompă dozatoare din PP, ce conține 50 ml spray cutanat, soluție.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

DAR AL DAWA PHARMA S.R.L.

Strada Claudiu, nr. 7, sector 2, București, România

#### **Fabricantul**

S.C. ROMASTRU TRADING S.R.L.

Str. Biharia nr. 67-77, Corp C-parter-camerele 24-38

Sector 1, cod poștal 013981, București, România

**Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie, 2022.**